

Præoperativ thromboserisikovurdering

Foretages ved enhver OP-tilmelding til COP

Risikofaktor:	1 point	2 points	3 points	5 points
Alder	40-<60 år	60-<75 år	>75 år	
Forventet OP-varighed	½-1 time	1-2 timer	2-3 timer	>3 timer
BMI	>30	>40	>50	
Kræftsygdom		tidligere	aktuel (eller kemoterapi)	
Thrombofili	Tidl.grav. med thrombfilii*	fam. disp. til DVT/LE	anamnese DVT / LE kendt thrombofili	apoplexi < 1md
"Særlige forhold":				
immobiliseret	x			
varicer	x			
venøs insuff. (hævede ben)	x			
Col. ulcerosa / Mb. Crohn	x			
hjertesygdom	x			
sepsis	x			
pneumoni	x			
KOL	x			
p-piller/HRT	x			
gravid/puerperal	x			
CVK		x		
hoftefraktur < 1md				x
bækkenfraktur < 1 md				x
benfraktur < 1md				x
hofte-/knæalloplastik				x
multiple traumer < 1 md				x
akut spinallæsion < 1md				x

Pointsum	Risikogruppe	Thromboseprofylakse
0-1 points	lav risiko	nej
2-4 points	moderat risiko	individuel vurdering
> 5 points	høj risiko	ja

*IUGR, foetus mortuus, gentagne aborter ell. præterm fødsel)

Kilde:
Farmakoterapi Nr.2, 2010,
Steen Elkjær Husted og Hans Kræmmer
Nielsen:
"Profylakse mod venøs tromboemboli".